

FÜR WEN IST DER HIV-SELBSTTEST GEEIGNET?

Der HIV-Selbsttest ist für Menschen, die ihren aktuellem HIV-Status nicht kennen.

Ausschlusskriterium: Bekannte HIV-Infektion

SAFER SEX REGELN




Mit zwei einfachen Regeln schützen Sie sich wirkungsvoll vor HIV.

1. Vaginalsex und Analsex mit Kondom
2. Individualisierte Empfehlungen zu Ihrer Sexualität gibt Ihnen der Safer Sex Check.

WANN WAR DAS LETZTE RISIKO?

Als Risiko gelten Anal- und Vaginalverkehr ohne Kondom und Spritzentausch unter injizierenden Drogenkonsument_innen.



ZEITFENSTER

Es gibt drei verschiedene Testvarianten für HIV. Labortests, Schnelltests 4. Generation und Selbsttests. Labortests und Schnelltests der 4. Generation, welche im professionellen Umfeld angeboten werden, können bereits nach zwei Wochen eine HIV-Infektion anzeigen, eine Infektion ausgeschlossen werden kann allerdings erst nach sechs Wochen. Die Selbsttests sind erst 12 Wochen nach Risiko aussagekräftig.

RESULTAT

Wenn ein Selbsttest positiv ist, muss eine HIV-Infektion erst durch einen Labortest bestätigt werden. Dazu sollten Kund_innen an Ärzt_innen oder eine spezialisierte Test- und Beratungsstelle weitergeleitet werden. Ein negatives Testergebnis bei einem korrekt durchgeführten Schnelltest schliesst eine HIV-Infektion aus für Risiken, die länger als 12 Wochen zurückliegen.

WEITERE INFORMATIONEN

Für Klient_innen: www.aids.ch/selftest oder www.sexuelle-gesundheit.ch/selftest, bei psychischen Problemen nach einem positiven Testresultat: Die dargebotene Hand (Telefonnummer 143)
E-Learning-Tool für Fachleute: xpertis.aids.ch

LINKS

www.aids.ch/testen
www.sexuelle-gesundheit.ch/beratungsstellen
www.pharmasuisse.org
www.lovelife.ch

* Test- und Beratungsstellen auf aids.ch/testen und www.sexuelle-gesundheit.ch/beratungsstellen